

〈カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 副作用報告〉

株式会社ヤクルト本社

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」の副作用報告について、下記のとおりご報告いたします。
自発報告のうち、本剤との因果関係が否定できないものとして報告された件数は以下のとおりです。

調査が終了していない症例も含まれており、今後の調査により内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

集計対象：2019年6月14日発売～2022年6月30日現在 112例(155件)

器官別大分類(SOC ^注)	副作用名(PT ^注)	重篤件数	総数
血液およびリンパ系障害	貧血	0	1
	白血球減少症	0	1
	好中球減少症	1	2
代謝および栄養障害	食欲減退	0	4
	高トリグリセリド血症	0	1
精神障害	徘徊癖	0	1
神経系障害	浮動性めまい	0	1
	感覚鈍麻	0	3
	記憶障害	0	1
	末梢性ニューロパチー	0	14
	錯感覚	0	1
	嗅覚錯誤	0	1
	味覚障害	0	4
眼障害	眼瞼紅斑	0	1
	霧視	1	1
耳および迷路障害	耳鳴	0	1
心臓障害	心筋梗塞	0	1
血管障害	大動脈解離	1	1
	血管痛	0	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	息詰まり感	0	1
	発声障害	0	1
	しゃっくり	0	1
	間質性肺疾患	2	2
	口腔咽頭痛	0	1
	咽頭異常感覚	0	1
	咽喉絞扼感	0	1
胃腸障害	異常便	0	1
	便秘	0	1
	下痢	1	12
	十二指腸潰瘍	0	1
	腸炎	1	1
	悪心	0	8
	食道炎	1	1
	口内炎	1	6
	変色歯	0	1
	嘔吐	0	3
	肝胆道系障害	肝機能異常	0
高ビリルビン血症		0	1

肝胆道系障害	肝障害	0	1
皮膚および皮下組織障害	脱毛症	0	1
	湿疹	0	1
	紅斑	1	1
	ヘンホッフ・シェーンライン紫斑病	0	1
	爪の障害	0	1
	手掌・足底発赤知覚不全症候群	1	39
	陰茎潰瘍形成	0	1
	そう痒症	0	2
	発疹	0	2
	痂皮	0	1
腎および尿路障害	頻尿	0	1
	尿閉	0	1
一般・全身障害および投与部位の状態	顔面浮腫	1	1
	注入部位血管外漏出	0	1
	注射部位疼痛	0	1
	倦怠感	0	4
	末梢性浮腫	1	1
	体調不良	0	1
臨床検査	血中ビリルビン増加	0	1
	血圧上昇	1	1
	フィブリンDダイマー増加	1	1
	好中球数減少	0	1
	血小板数減少	0	2
	白血球数減少	0	1
	総計	15	155

注) MedDRA/J Ver.25.0