

抗悪性腫瘍剤

毒薬・処方箋医薬品* *注意—医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

エルプラット[®]点滴静注液 50mg
100mg
200mg

一般名：オキサリプラチン



**【治癒切除不能な進行・再発の胃癌】
「効能・効果」、「用法・用量」追加承認のご案内**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、エルプラット[®]点滴静注液 50mg・同100mg・同200mgにつきまして、**【治癒切除不能な進行・再発の胃癌】**の「効能・効果」及び「用法・用量」の追加承認を取得いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

効能・効果〈抜粋〉

治癒切除不能な進行・再発の胃癌

用法・用量〈抜粋〉

1. 治癒切除不能な進行・再発の胃癌にはB法を使用する。なお、患者の状態により適宜減量する。

B法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはオキサリプラチンとして130mg/m²(体表面積)を1日1回静脈内に2時間で点滴投与し、少なくとも20日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。

今般の「効能・効果」、「用法・用量」の追加承認に伴い、「使用上の注意」につきましても改訂されております。詳細につきましては、最新の添付文書をご参照ください。