

いまさら聞けない!?

# 消化器がん Q←A

消化器がん治療・医療統計などの知識を振り返ってみましょう



第 11 回 2016年10月

**NEW 最新問題**

1 2 3 4 **5** 6

## Question 5

難易度: ★★☆☆

『食道癌診断・治療ガイドライン 2012年4月版』の食道がん補助療法に関する記載で、適切でないものを1つ選べ。

- 1. 現在の主な補助療法は、化学療法および放射線療法である。
- 2. 術前化学療法の中心は、5-FU+シスプラチン併用療法（FP療法）である。
- 3. 化学放射線療法には、治療中にみられる早期の有害事象と、治療終了後しばらくしてから起こる晩期の有害事象とがある。
- 4. FP補助化学療法の施行時期について、術前と術後を比較した第III相試験の結果、術後化学療法が有用であることが示された。
- 5. 切除可能食道がんに対する治療戦略として、欧米では術前化学放射線療法、わが国では術前化学療法が施行されることが多い。

◀ PREVIOUS

▶ Answer Check

NEXT ▶

難易度トップ3

チャレンジ! ▶



第 5 回 2015年12月

**Question 4**

Ranking

正解率 24%



第 5 回 2015年12月

**Question 5**

Ranking

正解率 25%



第 8 回 2016年05月

**Question 3**

Ranking

正解率 28%

バックナンバー

バックナンバー一覧 ▶

▶ [第10回 2016年08月](#)

▶ [第9回 2016年06月](#)

▶ [第8回 2016年05月](#)

難易度: ★★☆☆ …正解率 0～39%、★★☆☆ …正解率 40～79%、★☆☆☆ …正解率 80～100%

▶ お問い合わせ

▶ 本コンテンツは、兼松ウェルネス株式会社が制作・運営を行っております。